

Số: /UBND-NN

Bộc Nhiêu, ngày tháng 4 năm 2024.

V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh
hại lúa vụ Xuân năm 2024.

Kính gửi: Các ông trưởng xóm

Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ một số ruộng lúa bị vàng lá do cây lúa thiếu dinh dưỡng, thiếu nước, cây lúa chuyển đổi giai đoạn sinh trưởng và điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn đang phát sinh gây hại...

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lúa, UBND xã hướng dẫn một số biện pháp xử lý như sau:

1. Đối với ruộng vàng lá do thiếu dinh dưỡng, thiếu nước, cây lúa chuyển đổi giai đoạn sinh trưởng và thay đổi thời tiết:

- Không phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh vàng lá lúa .
- Áp dụng các biện pháp chăm sóc cho cây lúa phục hồi như: Đối với những ruộng thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân cho cây (bón thêm phân chuồng hoai mục, phân kaly, phun phân bón qua lá...) và bổ sung thêm nước trên chân ruộng cạn.

2. Đối với ruộng bị bệnh đạo ôn

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng (*đặc biệt trên giống Nép, JO2, Hương thuần, Bắc hương,...*) đối với những ruộng lúa đang bị đạo ôn và những ruộng xung quanh để kịp thời phát hiện các triệu chứng sớm của bệnh.

- Đối với những ruộng lúa đã xuất hiện bệnh đạo ôn, dùng bón phân đạm, phân bón lá và không phun các chất kích thích sinh trưởng. Giữ đủ nước trong ruộng 2-3 cm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu, khi vết bệnh mới xuất hiện.

- Những ruộng nhiễm bệnh đạo ôn hại nặng phải phun kép 2-3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ như: **Fuji-One 40EC; BEAM 75WP; Daconil 75WP; Credit 450EC; Camel 860WP; Starsuper 20SL, 60WP; Fuan 40EC; Katana 20SC...**

3. Đối với bệnh khô vằn:

Kiểm tra kỹ ở phần gốc và thân lúa, tiến hành phun thuốc trừ bệnh ở những ruộng có hiện tượng nhiễm bệnh.

Dùng một trong các loại thuốc sau: **Tokyo Nhật 220WP, Validacin 3SL, Tiltsuper 300EC, Anvil 5SC, Vida 5WP...** Sau khi phun thuốc 5 – 7 ngày kiểm tra lại nếu vẫn có vết bệnh mới phải phun nhắc lại.

Ngoài các đối tượng gây hại trên cần chú ý theo dõi diễn biến rầy các loại, bọ xít đen, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá gây hại trên lúa, chủ động áp dụng các biện pháp kịp thời để phòng trừ.

***Chú ý:** *Phun thuốc vào buổi chiều mát. Phun thuốc đúng nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì.*

Trên đây là một số hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa vụ xuân. UBND xã đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thông báo, triển khai đến bà con trong xóm các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiếu